

UNIfears®

oldatos szemcsepp tartósítószer nélkül

1. Milyen típusú készítmény az UNIfears és milyen esetekben alkalmazható?

Az UNIfears egy hipromellózt és dexpanthenolt tartalmazó oldatos szemcsepp, amely védelmet biztosít a szemnek, valamint hámosító és nedvesítő hatással rendelkezik. A hipromellóz a szem felületén ideiglenes védőréteget képez, nedvesen tartja a szem külső felületét, és pótolja a nem megfelelő mennyiségben termelődő könnyet. Megszünteti a szemszárazság érzetét és nyugtatólag hat a nem fertőzés okozta, enyhébb szemirritáció esetén. A B-vitaminok közé tartozó dexpanthenol hozzájárul a szemfelszín sejteinek regenerálódásához (hámosodás).

Az UNIfears nem tartalmaz tartósítószert, ezért kontaktlencsét viselő és érzékeny szemű egyének is alkalmazhatják.

Az UNIfears hosszan tartó enyhülést nyújt a következő esetekben:

- száraz szem szindróma (konjunktivitis sicca) okozta csökkent könnytermelés;
- a szaruhártya sérülése vagy károsodása;
- szemműtét után;
- diszkomfort érzés a szemben (égő, viszkető érzés, idegentestérzés, amelyeket külső tényezők (például légkondicionáló, szél, légszennyezés, füst, por) is okozhatnak);
- a szem túleröltetése (hosszas képernyő előtt töltött idő) és napközbeni látási nehézségek;
- kontaktlencse-viselés.

A készítményt felnőttek, serdülők és gyermekek egyaránt használhatják.

2. Tudnivalók az UNIfears alkalmazása előtt

Ne használja az UNIfears szemcseppet:

- ha allergiás a készítmény bármelyik összetevőjére.
- a szem maró anyag által okozott sérülésének akut fázisában mindaddig, amíg a kötőhártyazsákból teljesen el nem távolítják a maró anyagot és az elhalt szövetet.

Amennyiben jelenleg más szemészeti készítményt is alkalmaz, általános ajánlás, hogy az egyes készítmények alkalmazása között legalább 5 perc várakozási idő szükséges.

3. Hogyan kell alkalmazni a UNIfears szemcseppet?

Az ajánlott adag általában 1 csepp naponta 2-3 alkalommal, de gyakrabban is alkalmazható.

Az UNIfears hosszú távon is alkalmazható.

Figyelmeztetés


A szemcsepp alkalmazása után átmeneti égő érzés vagy homályos látás léphet fel, ezért az alkalmazás után várja meg, hogy látása kitisztuljon, mielőtt gépjárművet vezetne vagy gépeket kezelne.

Kontaktlencsét viselők

Az UNIfears kontaktlencse viselésével egyidejűleg is alkalmazható.

Óvintézkedések az alkalmazás során

1. Mosson kezet és vegyen fel kényelmes álló vagy ülő testhelyzetet.
2. Csavarja le a tartály kupakját.



3. Tartsa a tartályt lefelé fordítva.
4. Az első használat előtt javasolt, hogy az első cseppentést próbaképpen ne a szemben végezze, mivel erős vagy szabálytalan nyomás hatására a tartályból nagyobb mennyiségű oldat cseppenhet ki.
5. Az ujjával gyengéden húzza le a kezelendő szem alsó szemhéját.




6. Tartsa a cseppentőfeltét csúcsát közel a szeméhez, de úgy, hogy ne érintse a szemhez, illetve a szem környékéhez.

7. Nyomja össze gyengéden a tartályt úgy, hogy 1 csepp cseppenjen a szembe. Ezután engedje el az alsó szemhéjat, majd lassan csukja be szemét, hogy az UNItears szemcsepp egyenletesen eloszolhasson a szem felszínén.

A következő csepp alkalmazása előtt hagyja, hogy a levegő visszaszívódjon a tartályba és a tartály felvegye az eredeti alakját. Ezt követően folytassa a szemcsepp javasolt alkalmazását.

A tartály összenyomása és a csepp kicseppenése között eltelhet néhány másodperc. A tartályt nem szabad túl erősen összenyomni.



8. Szükség esetén ismételje meg a fenti eljárást a másik szemén is.

9. A cseppentőn esetlegesen ottmaradó oldat eltávolítása érdekében az alkalmazást követően a tartályt lefelé tartó mozdulattal rázza meg egyszer úgy, hogy a cseppentőfeltét ne érjen semmihez. Erre azért van szükség, hogy a szemcsepp sterilizálása biztosított legyen és a következő alkalmazásánál könnyebb legyen a cseppentés.



10. Használat után rögtön csavarja vissza szorosan a kupakot a tartályra.

4. Lehetséges mellékhatások

Ritkán, közvetlenül az alkalmazás után enyhe, átmeneti égő érzés fordulhat elő vagy a készítmény összetevőivel szembeni allergiás reakció alakulhat ki. Átmenetileg a szempillák összeragadása is előfordulhat.

A fenti mellékhatások kialakulásáról, vagy más, szokatlan tünet megjelenéséről tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét.

5. Mit tartalmaz az UNItears?

5 mg hipromellóz 1 ml oldatban, dexpanthenol, nátrium-klorid, dinátrium-edetát-dihidrát, tisztított víz.

6. Hogyan kell az UNItears szemcseppet tárolni?

A tartály legfeljebb 25 °C-on, az eredeti csomagolásban tárolandó.

Hűtőszekrényben nem tárolható. Nem fagyasztható!

A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!

A címkén és a dobozon (a homokóra jelzés mellett) feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza ezt a készítményt. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A tartály tartalmát az első felnyitás után 3 hónapon belül fel kell használni.

Csomagolás: 1 × 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava, Szlovákia

Tel: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu

CE 2265

STERILE A

A használati útmutató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2020. április